

ИНФОРИН

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

Торговое название:

Инфорин.

Международное непатентованное название:

Ибупрофен.

Лекарственная форма:

крем для наружного применения.

Состав: каждый 1 грамм крема содержит:

активное вещество: Ибупрофен 100 мг.

вспомогательные вещества: метил парагидрокси бензоат, пропилен парагидрокси бензоат, глицерол, пропилен гликол, белый мягкий парафин, эмульгатор SE-PF (состоит из глицерилстеарат / цетеарет-20 / цетеарет-12 / цетеариловый спирт / цетилпальмитат), жидкий парафин, цетиловый спирт, карбомер, натрия гидроксид, очищенная вода.

Фармакотерапевтическая группа: Нестероидное противовоспалительное средство (НПВС).

Код АТХ: M01AE01.

Фармакологическое действие:

Фармакодинамика:

Ибупрофен - производное фенилпропионовой кислоты и принадлежит группе нестероидных противовоспалительных лекарственных средств. Оказывает анальгезирующее и противовоспалительное действие. При местном применении снижает воспаления и боли. Механизм действия связан с ингибированием синтеза и/или освобождения простагландинов.

Фармакокинетика:

При локальном применении в виде 10% мази ибупрофен всасывается незначительно и не оказывает выраженного системного действия на организм. Медленно проникает в полость сустава, но задерживается в синовиальной ткани, создавая в ней большие концентрации, чем в плазме. Подвергается биотрансформации с образованием трех основных метаболитов. Терапевтический эффект препарата развивается в течение 15-30 минут и длится в течение 3-4 часов. Ибупрофен выводится из организма почками.

Показания к применению: Ибупрофен показан для:

- снижения симптомов воспаления при ревматоидном артрите, ювениальном идиопатическом артрите или болезни Стилла, дегенеративном ревматизме периферических суставов и позвоночника и других ревматических заболеваний суставов и мягких тканей;
- облегчения боли при спортивных так и при других повреждениях локомоторной системы и мягких тканей.

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к ибупрофену, ацетилсалициловой кислоте, а также к другим компонентам препарата;
- повышенная чувствительности к нестероидным противовоспалительным препаратам;
- почечная и/или печеночная недостаточность.
- беременности и период кормления грудью.

С осторожностью:

У пациентов с бронхиальной астмой, и особенно если употребляются другие НПВС, из-за явления бронхоспазма (неожидаемый спазм мышц бронхиальной стенки);

Необходима осторожность у детей до 12 лет.

Нельзя применять на ранах и инфицированных участках кожи.

Следует избегать попадания Инфорин крема в глаза или на слизистые оболочки глаза или другие слизистые оболочки (полости рта, носа, генитальной и анальной области).

Способ применения и дозы:

Препарат предназначен для местного применения. Перед применением крема следует очистить участок кожного покрова, на который наносят препарат. Инфорин крем наносят легко, втирая в кожу 3-4 раза в день. Рекомендуется избегать попадания крема в глаза и на слизистые оболочки. Запрещается наносить препарат на участок с поврежденной целостностью кожного покрова. После использования Инфорина крема следует тщательно вымыть руки.

Побочные действия:

Как правило, неблагоприятных эффектов при применении препарата не наблюдается. Возможны гиперемия кожи, ощущение жжения или покалывания. В редких случаях возможны аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, отек Квинке). При возникновении аллергических реакций лечение препаратом следует прекратить, в случае необходимости следует провести десенсибилизирующую терапию.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не существуют данные об одновременном применении других лекарственных средств и ибупрофена, назначенного для местного применения в виде крема.

Особые указания:

Препарат предназначен только для наружного применения. Следует избегать попадания лекарственного средства на слизистые оболочки (полости рта, носа, генитальной и анальной области), также нельзя наносить на открытую раневую поверхность, поврежденную кожу.

Не следует применять крем ибупрофен для лечения детей в возрасте до 12 лет в связи с отсутствием достаточных данных о безопасности и эффективности.

Следует с осторожностью применять препарат пациентам с гиперчувствительностью (аллергией) на другие вещества, проявляющейся раздражением кожи, зудом, крапивницей. Если симптомы сохраняются более 3 дней, следует проконсультироваться с врачом.

Влияние на способность управлять автомобилем или другими механическими средствами:

Не влияет.

Форма выпуска:

Крем для наружного применения 10%. В алюминиевой тубе 50г крема, вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

Указано на упаковке. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.