



СТОПКОЛИК

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Торговое название: Стопколик

Международное непатентованное название: нет

Лекарственная форма: капли для приема внутрь

Состав: каждый мл содержит:

Активные вещества:

Симетиконовая эмульсия USP

экв. симетикону 40 мг;

Укропное масло BP 0,005 мл;

Фенхелевое масло USP 0,0007 мл;

Вспомогательные вещества:

ментол, сахараза, метилпарабен натрия, пропилпарабен натрия, ксантановая камедь, жидкий сорбитол (сорбитол раствор 70%), полисорбат 80, хлороформ, бронопол, аспартам, ароматизатор Saunf (эссенция анисовая №1), натрия цитрат, кремния диоксид коллоидный, очищенная вода.

Описание

Почти белого цвета суспензия, заполненная в стеклянный флакон янтарного цвета.

Фармакотерапевтическая группа: Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ. Препараты для лечения функциональных расстройств ЖКТ. Препараты для лечения функциональных расстройств кишечника. Другие препараты для лечения функциональных расстройств кишечника.

Код АТХ: A03AX.

Фармакологическое действие

Фармакодинамика:

Стопколик - препарат, уменьшающий количество газов в кишечнике. Действующее вещество - симетикон обладает поверхностно активными свойствами и способностью снижать поверхностное натяжение на границе раздела сред жидкость-газ. При этом происходит сливание пузырьков газа и разрушение пены, вследствие чего высвободившийся газ получает возможность всасываться или выводиться естественным путем под влиянием перистальтики кишечника. Не абсорбируется из ЖКТ. Не метаболизируется и выводится в неизменном виде через кишечник.

Масло укропное действует как спазмолитическое средство. Помогает при нарушении процесса переваривания пищи, процессах брожения в кишечнике, болях в животе. Укропное масло также способствует отхождению газов, снимает болезненные спазмы.

Масло фенхелевое оказывает противорвотное, желчегонное, ветрогонное, слабительное, спазмолитическое, диуретическое, противомикробное и седативное действие. Повышает тонус кишечника и возбуждает аппетит.

Фармакокинетика:

Не абсорбируется из ЖКТ. Не метаболизируется и выводится в неизменном виде через кишечник.

Показания к применению

- кишечные колики у новорожденных и грудных детей.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- наследственная непереносимость фруктозы;
- кишечная непроходимость.

Способ применения и дозы

Перед употреблением флакон необходимо взбалтывать. Препарат принимают внутрь во время приема пищи или после еды, при необходимости также перед сном.

Младенцы до 6-и месяцев: по 5-10 капель 4 раза в день;

Дети от 6-12 месяцев: по 10-20 капель 4 раза в день;

Дети старше 1 года: по 20-25 капель 4 раза в день;

или по назначению врача.

Для удобного применения препарата, в частности маленьким детям, его можно предварительно смешать с

небольшим количеством кипяченой остывшей воды, детского питания, либо негазированной жидкости. Лечение продолжать до исчезновения недомоганий.

Побочное действие

В отдельных случаях - индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

Передозировка

Случаи передозировки препаратом не описаны.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Нет данных.

Особые указания

Препарат Стопколик содержит сорбитол (сорбит), поэтому его применение у пациентов с наследственной непереносимостью фруктозы противопоказано.

Применение при беременности и в период лактации:

В настоящее время нет данных о том, что симетикон обладает тератогенным или эмбриотоксическим действием. Возможно применение препарата в период беременности и лактации по назначению врача.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами:

Не установлено.

Форма выпуска

Капли для приема внутрь 15 мл в стеклянном флаконе.

Один флакон вместе с капельницей и инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Не замораживать.

Срок хранения

2 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска

Без рецепта.

Держатель торговой марки и регистрационного удостоверения
SPEY MEDICAL LTD
Lynton House, 7-12 Tavistock Square,
London, WC1H 9LT, UK (Великобритания)

Производитель
Next Wave (India)
Rampurghat Road, Paonta Sahib,
Distt. Sirmour, Himachal Pradesh, India (Индия)

Адрес организации, принимающей на территории Кыргызской Республики претензии от потребителей по качеству продукции (товара)
ООО «Aman Pharm» (Аман Фарм), Республика Кыргызстан, город Бишкек, ул. Шооруюкова 36.
Тел.: (0312) 560466, E-mail: aman.pharm12@gmail.com